## 哪些人較容易患視網膜脫落？

- 患有玻璃體後部剝離而引致視網膜撕裂的中年人士
- 視網膜有格子狀退化、萎縮性穿孔或馬蹄形撕裂
- 深近視（近視600度以上）
- 眼睛或眼眶創傷（包括手術）
- 患有某些遺傳性疾病（如馬凡氏綜合症、史蒂克勒綜合症等）
- 有視網膜脫落家族病史
- 糖尿性視網膜病變
- 早產嬰兒視網膜病變等

## 定期檢查　保護視力

請定期接受眼科檢查，以便及早診斷和治療各種眼疾，確保眼睛健康，為您守護視力。



視網膜邊緣退化和裂孔



查詢或預約，歡迎聯絡我們

## 養和眼科中心

**跑馬地**
**養和醫院**
香港跑馬地山村道2號李樹芬院4樓
(852) 2835 8880 ; (852) 2835 8890
(852) 2892 7510
eye@hksh-hospital.com
www.hksh-hospital.com

**金鐘**
**養和醫健專科中心**
香港金鐘道88號太古廣場一座21樓
(852) 2855 6700　(852) 2523 7660
eye@hksh-healthcare.com
www.hksh-healthcare.com

辦公時間
星期一至星期五　上午九時至下午五時
星期六　上午九時至下午一時
星期日及公眾假期休息

**敬請預約**

*內容已採納病人意見*

OPH.111.H/C-08-082026

李樹芬醫學基金會 LI SHU FAN MEDICAL FOUNDATION

養和醫療集團成員 Members of HKSH MEDICAL GROUP
養和醫院 HONG KONG SANATORIUM & HOSPITAL
養和醫健 HKSH HEALTHCARE
養和東區醫療中心 HKSH EASTERN MEDICAL CENTRE
養和癌症中心 HKSH CANCER CENTRE
養和創新及專業培訓學院 HKSH INSTITUTE FOR INNOVATION & PROFESSIONAL DEVELOPMENT

© 養和醫療集團有限公司版權所有。



# 飛蚊症及視網膜脫落





玻璃體液化、退化及飛蚊

## 何謂飛蚊症？

我們眼球內的晶狀體和視網膜之間，充滿著稱為「玻璃體」的啫喱狀組織。隨著年紀增長，玻璃體會逐漸退化和液化，令眼前出現一些黑點或線條在視線中漂浮，俗稱「飛蚊」。飛蚊的大小和形狀不一，包括小點、圓形、線狀或網狀等。

老化引致的飛蚊，一般數目較少，通常只在注視着明亮而純色的背景時出現，如白牆或藍天。這種生理變化所引致的飛蚊症，是玻璃體退化過程中的正常現象。

## 閃光、急性玻璃體後部剝離和視網膜脫落

疾病導致的飛蚊，一般數目較多且會突然出現。病因可能是眼球內出血、虹膜炎，又或因玻璃體收縮令其跟眼底視網膜分離，引致急性玻璃體後部剝離(Posterior Vitreous Detachment，PVD)。鑑於玻璃體拉扯視網膜，患者亦可能見到「閃光」。

飛蚊及閃光都是視網膜撕裂的症狀，一旦視野出現部分缺損，有可能是視網膜脫落。如突然出現飛蚊或閃光，應立即諮詢眼科專科醫生並接受放瞳檢查，以準確診斷成因。如未能及時治理，視網膜撕裂有可能會逐步惡化為視網膜脫落。



玻璃體後部剝離



視網膜撕裂及脫落

## 視網膜脫落的徵狀

- 飛蚊增加
- 閃光增加
- 視野缺損
- 視覺影像變形或受阻

## 治療視網膜脫落

視網膜退化或撕裂可以激光修補，而視網膜脫落則必須以手術治療。手術主要分為兩種：在眼球外施行的鞏膜外壓術，以及在眼球內進行的玻璃體切除術及氣體或硅油注射。兩種手術均包括冷凍療法或視網膜激光治療。


玻璃體切除術