查詢或預約，歡迎聯絡我們

養和眼科中心

跑馬地
養和醫院
香港跑馬地山村道2號李樹芬院4樓
(852) 2835 8880 ; (852) 2835 8890
(852) 2892 7510
eye@hksh-hospital.com
www.hksh-hospital.com

金鐘
養和醫健專科中心
香港金鐘道88號太古廣場一座21樓
(852) 2855 6700　(852) 2523 7660
eye@hksh-healthcare.com
www.hksh-healthcare.com

辦公時間
星期一至星期五　上午九時至下午五時
星期六　上午九時至下午一時
星期日及公眾假期休息

敬請預約

OPH.129I.H/C-07-092026

李樹芬醫學基金會 LI SHU FAN MEDICAL FOUNDATION

養和醫療集團成員 Members of HKSH MEDICAL GROUP
養和醫院 HONG KONG SANATORIUM & HOSPITAL
養和醫健 HKSH HEALTHCARE
養和東區醫療中心 HKSH EASTERN MEDICAL CENTRE
養和癌症中心 HKSH CANCER CENTRE
養和創新及專業培訓學院 HKSH INSTITUTE FOR INNOVATION & PROFESSIONAL DEVELOPMENT

© 養和醫療集團有限公司版權所有。

www.hksh.com

植入式隱形眼鏡



養和眼科部

在植入式隱形眼鏡手術方面，養和眼科中心已累積逾二十年豐富經驗。近年中心引入第五代植入式隱形眼鏡鏡片，既能達致更佳夜視效果，亦可提供更多尺寸以滿足不同需要。中心一直致力提升眼科護理技術，不斷優化臨床技術和服務質素，致力提升患者的視力及生活質素。

植入式隱形眼鏡是甚麼？

植入式隱形眼鏡又稱「眼內透鏡」，是指透過手術置入眼球內的晶體，由適合植入人體的塑膠或矽膠製成。手術利用微創技術，在虹膜後面放入植入式隱形眼鏡，在無須摘除原有晶狀體的情況下治療屈光不正。

當光線進入眼球後，因無法聚焦在視網膜上，導致影像模糊，這種情況稱為「屈光不正」。植入式隱形眼鏡可令光線聚焦在視網膜上，令遠距影像回復清晰，減低病人對眼鏡或隱形眼鏡的倚賴。

誰適合接受植入式隱形眼鏡手術？

植入式隱形眼鏡手術可改善深度屈光不正，並保存良好視力質素。

適用屈光不正範圍

- 高達1800度近視
- 高達1000度遠視
- 高達600度散光

如何進行植入式隱形眼鏡手術？

植入式隱形眼鏡手術屬日間手術，病人只需接受局部麻醉。醫生先會為病人眼睛滴麻醉藥水，然後在角膜上開一個小切口，在眼睛的晶體和虹膜之間植入隱形眼鏡。手術後角膜切口會自然癒合。



於眼睛滴麻醉藥水　通過角膜上的微小切口，將隱形眼鏡推注眼內　植入及調整隱形眼鏡至虹膜後方



植入式隱形眼鏡位於虹膜與晶體狀之間，能完整保留眼部生理結構和調節功能

植入式隱形眼鏡手術後注意事項

- 切勿揉搓眼睛，以免導致感染或令已植入的隱形眼鏡移位
- 必須按指示滴眼藥水以防發炎及感染
- 少用流動電子裝置，避免令眼睛過度疲勞
- 外出時戴上太陽眼鏡，防止紫外光傷害眼睛
- 定期接受眼科檢查

手術可以還原嗎？

植入式隱形眼鏡手術是可以還原的。如有需要，醫生可替病人移除或更換植入式隱形眼鏡。

與白內障手術使用的人工晶體有何分別？

白內障手術須先移除已混濁的自然晶體，再放入人工晶體，而植入式隱形眼鏡手術則無須移除眼球本身的自然晶體。後者可以保留眼睛的自動調節功能來看近物，其引致視網膜脫落的風險亦低於白內障手術。