



冷凍治療

我為何要接受冷凍治療？

如因子宮頸糜爛導致陰道分泌物增加或性交後出血，可接受冷凍治療。

甚麼是冷凍治療？

將一大小適中的子宮頸探針置於子宮頸，並以一氧化氮作冷凍劑，將子宮頸溫度降至攝氏零下60至70度，為時數分鐘。如陰道分泌關乎生殖道受感染，又或性交後出血與子宮頸癌或癌前病變有關，則不宜進行治療。

治療會否引起痛楚及出血？治療後會否感到不適？

治療一般不會引致出血或痛楚，但您或會感到有點不適。陰道在治療後首六週內將排出大量分泌物，期間應避免進行性行為。

治療有何風險？

生殖道受損風險微乎其微。

治療前該作何準備？

應避免在治療前三日進行性行為。

治療會否影響我的生育能力？

不會。待治療完成後完全康復，您便可以懷孕。

治療是否有效？

逾九成病人的病徵均在治療後有所改善。如病徵持續或再現，或需再次接受治療。

婦產科中心

如需緊急診治，請致電本院總機：(852) 2572 0211

婦產科中心：(852) 2835 7878

香港跑馬地山村道二號 李樹芬院五樓
電話：2835 7878 傳真：2892 7581
電郵：ogc@hksh-hospital.com
醫院網址：www.hksh-hospital.com

星期一至五：上午九時至下午五時
星期六：上午九時至下午一時
(星期日及公眾假期休息)