



子宮輸卵管X光造影

什麼是子宮輸卵管X光造影？

子宮輸卵管X光造影(HSG)是一種X光檢查，專為較難懷孕的女士而設，有助醫生觀察子宮宫腔形態及輸卵管。檢查需時約一小時，完成後即可離開。

檢查期間，醫生會將顯影劑經子宮頸注入子宮，作造影之用，按影像評估宫腔形狀及輸卵管有否阻塞。

如何預備子宮輸卵管X光造影？

為確定你在檢查期間並無懷孕，檢查一般會於月經周期第九至第十一天內進行，事前不宜進行性行為。

檢查前，你可以如常進食。醫生或會於檢查前半小時處方止痛藥，助你在檢查期間盡量放鬆。醫生亦可能會處方抗生素，以防細菌感染。

如何進行子宮輸卵管X光造影？

檢查一般會於醫院或診所之X光室進行。一如一般婦科檢查，醫生會將窺器放進陰道，然後將一條導管經子宮頸放入子宮，再注入顯影劑，以拍攝子宮及輸卵管的X光影像。

檢查期間及以後會有何感覺？

在檢查期間或完成後數小時，你或會有輕微抽搐。服用醫生處方之止痛藥，有助舒緩抽搐。檢查後，顯影劑或會連帶少量血絲流出體外，宜事先準備衛生巾。一般可於檢查後回復正常活動。

子宮輸卵管X光造影有何風險？

子宮輸卵管X光造影素來安全，惟需注意若干潛在風險。

一般而言，檢查後盆腔感染的機會率低於1%。曾患盆腔發炎的女士，風險會相對較高。醫生一般在檢查前處方預防性抗生素，以減低感染的機會，因此檢查後需繼續服用，直至服完為止。

顯影劑含有碘質，有可能會引起過敏反應，惟機會極微。如你對碘質過敏，檢查前應提醒醫生。檢查期間或完成後如覺痕癢、臉部腫脹或出疹，應立即通知醫生。

檢查或會令子宮或輸卵管受損，惟機會極微。

檢查過後，陰道或有帶血分泌物。隨後數日或有輕微出血。如有發燒、嚴重肚痛或大量出血等情況，應通知醫生。

如需緊急診治，請致電本院總機：(852) 2572 0211

婦產科中心：(852) 2835 7878

香港跑馬地山村道二號 李樹芬院五樓
電話：2835 7878 傳真：2892 7581
電郵：ogc@hksh-hospital.com
醫院網址：www.hksh-hospital.com

星期一至五：上午九時至下午五時
星期六：上午九時至下午一時
(星期日及公眾假期休息)