



電環切除術

什麼是電環切除術？

電環切除術是一種治療子宮頸癌前期病變的手術。醫生會以通有電流的幼細線圈代替手術刀，從子宮頸切除一小片異常細胞組織作病理分析。通過這項簡單的手術來治療子宮頸病變，能確保病變完全切除。

手術如何進行？

手術一般需時二十至三十分鐘，程序與陰道鏡檢查相似。醫生會先清洗子宮頸，再於子宮頸表面抹拭碘溶液，以便觀察病變範圍。隨後醫生會於子宮頸注射麻醉藥，以作止痛之用。期間您或會感到心跳加速，全身發熱泛紅、面部有輕微刺痛或輕微顫抖。此類癥狀會於一、兩分鐘後消失。

醫生接著會將帶有電流的線圈穿過子宮頸表面，切除病變範圍。期間您會聽到儀器及抽氣發出的聲響，而下腹亦可能會抽搐或隱隱作痛。屆時你只要放鬆肌肉及稍作深呼吸，便能舒緩不適。如不適或痛楚持續加劇，請立刻通知醫生。手術完成後，你只需休息片刻，便可出院。

手術前該作何準備？

應避免在手術前二十四小時灌洗陰道、使用陰道藥物、放入衛生棉條或進行性行為。在手術前先排清大小便，亦會令您較為舒服。

手術後要注意什麼？

手術完成後，陰道或會排出呈綠黃色或棕黑色帶血的分泌物，情況一般會維持六星期，份量因人而異。傷口會在手術後四星期內逐漸癒合。手術後六星期內切勿進行性行為、灌洗陰道或將衛生棉條/任何東西放入陰道，詳情請遵照醫生指示。如陰道出血量多於正常月經，應立即聯絡本院。

手術會否影響生育？

除非是於子宮頸內口深處發現不正常病變，否則手術一般只會切除一小片子宮頸的表面組織，理應無礙病人日後懷孕。記緊在手術前與醫生商討有關細節。

手術有沒有風險？

一般而言，電環切除術非常安全。手術會有感染及出血的風險，但機會輕微。

何時才收到手術報告？

請您與醫生預約，確保可在手術後一至兩星期內覆診，以便檢查子宮頸傷口及商討病理分析結果，決定是否要作額外治療。

如需緊急診治，請致電本院總機：(852) 2572 0211

婦產科中心：(852) 2835 7878

香港跑馬地山村道二號 李樹芬院五樓
電話：2835 7878 傳真：2892 7581
電郵：ogc@hksh-hospital.com
醫院網址：www.hksh-hospital.com

星期一至五：上午九時至下午五時
星期六：上午九時至下午一時
(星期日及公眾假期休息)