



腎活組織檢查

查詢或預約，歡迎聯絡我們

養和腎臟內科中心

📍 跑馬地

養和醫院

香港跑馬地山村道2號李樹培院10樓

☎ (852) 2835 7084 📠 (852) 2892 7513

✉ nephrology@hksh-hospital.com

🌐 www.hksh-hospital.com

辦公時間


星期一至星期五 上午八時至下午五時

星期六 上午八時至下午一時

星期日及公眾假期休息

敬請預約

NEP002HH/C-04-112025



養和醫療集團成員 Members of HKSH Medical Group

養和醫院
Hong Kong Sanatorium & Hospital

養和醫健
HKSH Healthcare

養和東區醫療中心
HKSH Eastern Medical Centre

養和癌症中心
HKSH Cancer Centre

養和腎臟內科中心

簡介

醫生採用穿刺針經皮膚刺入腎臟，取出極少許腎臟組織化驗以診斷腎臟病變。抽取腎臟組織時，須施行局部麻醉，並在超聲波指引及無菌技術下進行。

準備工作

- 須提早一天到醫院進行抽血檢查
- 檢查當天可進食輕量早餐及服食常規藥物（檢查當天須停服降血壓藥物）
- 糖尿病患者須如常服食糖尿藥或注射胰島素
- 須於檢查前一星期停止服食薄血藥、阿士匹靈、中藥、深海魚肝油或亞麻籽
- 須簽署手術同意書

過程

- 檢查在超聲波監測下進行
- 病人須俯臥，工作人員會將毛巾放置在病人腹部。醫生注射局部麻醉後，利用超聲波的指引，在皮膚切一個小口，然後用腎活檢針穿過切口直達腎臟
- 當抽取腎組織時，須暫時閉氣
- 醫生取出穿刺針後，會在傷口貼上壓力膠布
- 整個過程需時約20至30分鐘

護理和建議

- 壓力膠布須敷上24小時，以防止傷口出血
- 須臥床休息24小時
- 護士會為病人定時檢查血壓及脈膊，直至回復正常為止
- 每次小便時，須留樣本予護士檢查
- 如傷口或小便有明顯出血現象，須立即通知護士
- 飲食及大小便均須在床上進行
- 如無出現異常情況，翌日可下床活動，並在隔天出院
- 請勿在一至兩週內提舉重物或進行劇烈運動

併發症

- 輕微傷口出血，一般能自癒
- 血尿
- 傷口感染
- 如病人本身患有高血壓及腎臟萎縮，其出血的機會較高
- 嚴重出血而須施行腎動脈栓塞止血的情況極少。如情況嚴重，將須在放射指引下止血。如有流血不止的情況，可能須要進行腎臟切除手術，但情況極為罕見

檢查報告

覆診時可得知活檢報告結果。

如有任何異常情況，請即到門診部或腎臟內科中心求診。