

3. 進一步檢查

遇有任何異常狀況時，除接受臨床檢查及乳房X光造影檢查或超聲波檢查外，醫生可能會建議接受磁力共振及活組織檢查，以協助更準確診斷。

根據香港乳癌基金會於2023年出版的香港乳癌資料庫第15號報告的資料顯示，有接受定期乳房普查的乳癌病人相比於自行發現腫瘤徵狀的乳癌病人，無論腫瘤的大小、期數、淋巴結轉移及所須治療的複雜性均大大減低。由此可見，乳房普查是非常重要，愈早發現，治療愈簡單，成效亦愈佳。

參考資料：
香港乳癌基金會
www.hkbcf.org



乳房護理中心

乳房護理中心

跑馬地

養和醫院

香港跑馬地山村道2號李樹培院9樓

電話：(852) 2835 8290

傳真：(852) 2892 7563

bcc@hksh-hospital.com

www.hksh-hospital.com

辦公時間

星期一至星期五：上午九時至下午五時

星期六、星期日及公眾假期休息


敬請預約


養和

查詢或預約，歡迎聯絡我們



乳房普查服務





什麼是乳房普查？

定期進行乳房檢查是及早預防乳癌或乳房病變的第一防線，愈早發現，治癒機會亦愈高。

香港乳癌概況

乳癌是香港女性最常見的癌症，病例逐年不斷增加，約佔香港女性癌症新症的三分之一。如能在乳癌第一期及早發現，大部份病者都可以治癒而生存率頗高。因此，女士必須定期進行乳房普查，以便及時作出跟進和治療。







誰應該接受乳房普查？

任何女性年滿20歲或具有下列風險因素，均須定期接受乳房普查：

- 從未餵哺母乳
- 超重或肥胖
- 從未生育或35歲後首次生育
- 有家族乳癌病史
- 12歲前初經
- 使用荷爾蒙補充劑

良好乳房檢查習慣

1. 自我檢查乳房三部曲：觀察、觸摸、比較

乳 癌 的 徵 狀	乳 房	有無痛硬塊 	外表凹陷或凸出 	 皮膚呈橙皮樣變化、出現紅疹、不癒合的傷口、出血或潰爛
	乳 頭	內陷或不對稱 	表皮破損、脫皮、出血或有分泌物 	腋 下  有腫塊或淋巴結發大

2. 定期乳房普查

年齡	自我檢查	臨床檢查	乳房X光造影檢查	超聲波檢查
	如發現有任何異常，須及早求醫診治	專業醫護人員以觸診協助檢測病人未能注意的問題	造影檢查可幫助驗出觸診未能發現的腫瘤，如微小的鈣化、結構異常等	有助分辨腫瘤或水囊，及檢測疑似癌症的特徵
20至39歲	每月一次 (月經後)	每三年一次，或按照醫生建議	建議35至39歲接受初次的乳房X光造影檢查，或按照醫生建議	每三年一次，或按照醫生建議
40歲或以上	每月經期後檢查一次；如經期不準或已停經，則於每月的同一日檢查	每兩年一次，或按照醫生建議	每一至兩年一次，或按照醫生建議	如乳腺密度高，醫生可能建議進行超聲波檢查以配合乳房X光造影檢查