



膠囊內視鏡檢查

For enquiries and appointments,
please contact us

HKSH Endoscopy Centre


📍 **Happy Valley**
Hong Kong Sanatorium & Hospital
15/F, Li Shu Pui Block
2 Village Road, Happy Valley, Hong Kong
☎ (852) 2835 8623 🏠 (852) 2892 7529
✉ endo@hksh-hospital.com
🌐 www.hksh-hospital.com

Service Hours

Monday to Saturday 8:00 am – 4:00 pm
Closed on Sundays and Public Holidays

Consultation by Appointment

END.0081H/C-02-112025



養和醫療集團成員 Members of HKSH Medical Group

養和醫院 Hong Kong Sanatorium & Hospital | 養和醫健 HKSH Healthcare | 養和東區醫療中心 HKSH Eastern Medical Centre | 養和癌症中心 HKSH Cancer Centre

養和內鏡中心

膠囊內視鏡檢查是利用吞服式內置無線攝錄機的膠囊，進行無痛內鏡消化系統攝影，以評估隱性出血、腹痛、貧血等消化道問題。

膠囊內視鏡是怎樣施行的？

檢查時，病人須吞服一粒附有內置攝影功能的膠囊（11毫米 X 26毫米）；膠囊經過消化道時，會拍攝腸內情況，把彩色影像傳送到貼在病人腹部的接收器，並記錄於記錄儀上。記錄儀會用腰帶掛在病人的腰部，因此不會妨礙病人的正常活動。


一般來說，膠囊在胃內停留約一小時，而經過小腸則要三個半至四小時。腸胃科醫生亦須用兩小時審閱所接收的影像。

為什麼要施行膠囊內視鏡檢查？

膠囊內視鏡檢查能幫助醫生診斷一些復發性或持續性，但又經其他診斷方法仍找不到原因的症狀，如：腹痛、腹瀉、流血或貧血。

膠囊內視鏡檢查前有什麼須要預備？

1. 檢查前一天，須作腸道準備。
2. 接受膠囊內視鏡檢查前八小時不可飲食。
3. 你的腹部會被貼上接收器，再接駁記錄儀，並用腰帶掛在腰部。
4. 依指示飲用少量清水吞服膠囊。
5. 吞服膠囊後，須繼續禁食兩小時。
6. 依醫生指示，方可開始流質飲食。
7. 八小時後，接收器、記錄儀及腰帶會被除去。
8. 依醫生指示，便可恢復正常飲食。
9. 檢查當日，須記錄飲食及活動的情況及時間。



膠囊內視鏡檢查後會有什麼結果？

檢查完畢後，專科醫生會審核所有接收的影像。一般來說，膠囊將隨大便於二十四小時內排出並棄置。

膠囊內視鏡檢查有什麼禁忌症及危險？

1. 由吞服膠囊至其排出體外前，不能接受磁力共振檢查或接近磁場。
2. 如病人體內置有心臟起搏器，可在特別安排下接受檢查。
3. 已被診斷為小腸狹窄病者，須視乎個別情況方可接受是項檢查。若膠囊由於腸道梗阻而不能自行排出體外，可能須用內鏡或手術除去。